

Jakie są przyczyny wad wymowy?

Jest ich wiele, ale do najczęściej występujących należą:

- Nieprawidłowości w budowie narządów artykulacyjnych, np. krótkie wędzidełko podjęzykowe, zbyt krótkie wędzidełka wargowe, język gruby, długi lub krótki, mocno wysklepione podniebienie twarde, skrzywienie przegrody nosowej... .
- Wady zgryzu, np. zgryz otwarty, krzyżowy, przodozgryz,
- Słabsza motoryka narządów mowy, w tym niesprawne lub mało sprawne narządy aparatu artykulacyjnego, np. języka i warg,
- Choroby alergiczne i laryngologiczne, np. przerośnięty trzeci migdał, zbyt duże migdałki podniebienne, częste choroby narządu słuchu,
- Wady słuchu, np. niedosłuch,
- Opóźnienia lub zaburzenia analizatora słuchowego, np. słabsze funkcjonowanie słuchu fonemowego, fonetycznego, pamięci słuchowej, analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
- Błędy rodziców w opiekowaniu się dzieckiem, np. zbyt długie karmienie dziecka butelką, pozwolenie na długoletnie ssanie smoczka czy kciuka, stosowanie niewłaściwych smoczków,
- Niekorzystne czynniki środowiskowe, w tym nieprawidłowe wzorce językowe w domu, np. wadliwa, często szybka i niestaranna mowa samych rodziców.

Opracowała: Ewa Skonieczna